

Bacaid

Baclofen

বেকএইড

বেক্লোফেন

Composition :

Bacaid 10 Tablet: Each film coated tablet contains Baclofen BP 10 mg.

Description :

Baclofen is a centrally acting skeletal muscle relaxant and an antispastic agent with a spinal site of action.

Indications :

Chronic severe spasticity resulting from disorders such as multiple sclerosis or traumatic partial section of spinal cord.

Dosage and administration :

Adults: Start therapy at a low dosage and increase gradually until optimum effect is achieved (usually between 40-80 mg daily).

The dosage is as follows:

5 mg t.i.d. for 3 days
10 mg t.i.d. for 3 days
15 mg t.i.d. for 3 days
20 mg t.i.d. for 3 days

Thereafter, additional increases may be necessary but the total dose should not exceed a maximum of 80 mg daily.

Children: Usual maintenance dose is 0.75-2 mg/kg daily in divided dose.

Side effects :

The most common side effects include drowsiness, nausea, dizziness, lassitude, confusion, fatigue, muscular pain and hypotension.

Use in special group :

Pregnancy: There are no adequate and well controlled studies of Baclofen in pregnant women. So it should be used during pregnancy only if the potential benefit outweighs the potential risk to the fetus.

Lactation: Baclofen is excreted in breast milk, so caution should be exercised when administered to a nursing woman.

Pediatric Use: Safety and effectiveness in pediatric patients below the age of 12 years have not been established.

Contraindications :

Baclofen is contraindicated in patients with hypersensitivity to any component of this product.

Precautions :

Baclofen stimulates gastric acid secretion and should be used with caution in patients with a history of peptic ulcer. It should also be used with caution in patients with severe psychiatric disorders or epilepsy or convulsive disorders.

Drug Interaction :

- There may be increased weakness if Baclofen is given to patients taking a tricyclic antidepressant
- There may be an increased hypotensive effect if it is given to patients receiving antihypertensive therapy

Storage :

Store in a cool and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

Commercial Pack :

Bacaid 10 Tablet: Each box contains 3 x 10 tablets in Alu-PVDC blister pack.

Labaid
pharma

Manufactured by: LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Savar, Dhaka, Bangladesh

PS-IS-002/V01

উপাদান :

বেকএইড ১০ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে বেক্লোফেন বিপি ১০ মি.গ্রা.।

বর্ণনা :

বেক্লোফেন কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করার মাধ্যমে স্ক্যালিটাল পেশীকে শিথিল করে এক স্পাইনাল অংশে কাজ করার মাধ্যমে এ্যাক্টিস্পাস্টিক কার্য সম্পাদন করে থাকে।

নির্দেশনা :

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ও স্পাইনাল কর্ডের ক্ষতজনিত তীব্র স্পাস্টিসিটিতে।

মাত্রা ও সেবাবিধি :

প্রাপ্ত বয়স্কঃ স্বল্পমাত্রা দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত এবং সর্বোচ্চ কার্যকারিতা না পাওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়তে হবে (স্বাভাবিকভাবে ৪০-৮০ মি.গ্রা. দৈনিক)।

মাত্রাগুলো নিম্নরূপঃ

৫ মি.গ্রা. করে দৈনিক ৩ বার, ৩ দিন।

১০ মি.গ্রা. করে দৈনিক ৩ বার, ৩ দিন।

১৫ মি.গ্রা. করে দৈনিক ৩ বার, ৩ দিন।

২০ মি.গ্রা. করে দৈনিক ৩ বার, ৩ দিন।

প্রয়োজন অনুসারে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু দৈনিক সর্বোচ্চ ৮০ মি.গ্রা. এর বেশি নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রেঃ সাধারণ গ্রহণমাত্রা দৈনিক ০.৭৫-২ মি.গ্রা./কোজি করে বিভক্ত মাত্রায়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হল- ঘুমঘুম ভাব, বমি বমি ভাব, ঝিমুনি, অবসন্নতা, ঝিখাগ্রহতা, ক্রান্তি, মাংসপেশীতে ব্যথা ও নিম্ন রক্তচাপ।

বিশেষ গ্রুপের ব্যবহার :

গর্ভাবস্থায়ঃ গর্ভাবস্থায় বেক্লোফেন সেবনের কোনো পর্যাপ্ত ও ভালো তথ্য পাওয়া যায়নি। যদি জন্মের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের চেয়ে এর প্রয়োজন অধিক হয় তবেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালেঃ মায়ের দুধে বেক্লোফেন নিঃসৃত হয়। তাই দুগ্ধদানরত মায়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

শিশুঃ ১২ বছরের নিম্নে শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রতিনির্দেশনা :

বেক্লোফেন এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা :

বেক্লোফেন গ্যাস্ট্রিক এসিডের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয় বলে পেপটিক আলসারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও মানসিক বিকারগ্রন্থ বা মৃগী বা ঝিচুনি রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :

- ট্রাইসাইক্লিক এ্যাক্টিভেইজিংসের সাথে বেক্লোফেন গ্রহণ করলে দুর্বলতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে
- উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের সাথে বেক্লোফেন গ্রহণ করলে নিম্ন রক্তচাপের প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে

সংরক্ষণ :

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা এবং শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ :

বেকএইড ১০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩ x ১০ টি ট্যাবলেট, অ্যালু-পিভিডি সিস্টার প্যাকে।

Labaid
pharma

প্রস্তুতকারকঃ ল্যাবএইড
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
সাতার, ঢাকা, বাংলাদেশ