

Montilab

Montelukast

Composition :

Montilab 5 Tablet: Each chewable tablet contains Montelukast 5 mg as Montelukast Sodium USP.

Montilab 10 Tablet: Each film coated tablet contains Montelukast 10 mg as Montelukast Sodium USP.

Description :

Montelukast is a selective and orally active leukotriene receptor antagonist that specifically inhibits cysteinyl leukotriene receptor.

Indications :

Montelukast is indicated for the prophylaxis and chronic treatment of asthma. It is also indicated for the relief of seasonal allergic rhinitis in adults and pediatric patients and exercise induced bronchoconstriction.

Dosage and administration :

Prophylaxis of Asthma:

Adults and Children (over 15 years): 10 mg once daily in the evening.

Children (6 years-15 years): 5 mg once daily in the evening.

Children (6 months-6 years): 4 mg once daily in the evening.

Seasonal Allergic Rhinitis:

Adults and Children (over 15 years): 10 mg once daily in the evening.

Exercise Induced Bronchoconstriction: 10 mg tablet at least 2 hours before exercise.

Side effects :

Montelukast appears to be well tolerated, The most common adverse effects reported are headache, rash, dyspepsia, dizziness, edema, tremor, suicidal thoughts and abdominal pain.

Use in special group :

Pregnancy: Montelukast has been assigned to pregnancy category B. It should be used during pregnancy only if clearly needed.

Lactation: It is not known if Montelukast is excreted in human milk.

Pediatric use: Montelukast has been studied in pediatric patients (2 to 14 years of age). Studies have shown that Montelukast does not affect the growth rate of pediatric patients.

Contraindications :

Hypersensitivity to Montelukast or any component of this product.

Precautions :

Do not prescribe Montelukast to treat an acute asthma attack. Patients with known aspirin sensitivity should continue to avoid aspirin or NSAID agents while taking Montelukast.

Drug Interaction :

Montelukast may be administered with therapies routinely used in the prophylaxis and chronic treatment of asthma. In drug interaction studies, the recommended clinical dose of Montelukast does not have clinically important effects on the following medicinal products: Theophylline, Prednisone, Prednisolone, Oral Contraceptives, Terfenadine, Digoxin and Warfarin. Caution should be exercised, particularly in children, when Montelukast is co-administered with Phenytoin, Phenobarbital and Rifampicin.

Storage :

Keep away from light and moisture, store in a cool place. Keep out of the reach of children.

Commercial Pack :

Montilab 5 Tablet : Each box contains 3 x 10 tablets in Alu-Alu blister pack.

Montilab 10 Tablet : Each box contains 2 x 10 tablets in Alu-Alu blister pack.

Labaid
Pharma

Manufactured by: LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Savar, Dhaka, Bangladesh

PS-US-013/V02

মন্টিল্যাব

মন্টিলুকাস্ট

উপাদান :

মন্টিল্যাব ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট ৫ মি.গ্রা., মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউ-এসপি হিসাবে।

মন্টিল্যাব ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট ১০ মি.গ্রা., মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউ-এসপি হিসাবে।

বর্ণনা :

মন্টিলুকাস্ট মুখে সেবনযোগ্য একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর এক্টোপোনিষ্ট যা সিসটাইনাইল লিউকোট্রাইন রিসেপ্টরকে প্রতিহত করে।

নির্দেশনা :

মন্টিলুকাস্ট অ্যাজমা রোগের প্রতিষেধক এবং দীর্ঘস্থায়ী অ্যাজমা রোগের ব্যবস্থাপনায় নির্দেশিত। এটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের সিজন্সাল এলার্জিক রাইনাইটিস উপশমে এবং শরীরচর্চা জনিত শ্বাসনালীর সংকোচনেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি :

অ্যাজমা রোগের প্রতিষেধক হিসাবে:

প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু (১৫ বছরের উর্ধ্বে): ১০ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার সন্ধ্যায় গ্রহণ করতে হবে।

শিশু (৬ বছর-১৫ বছর): ৫ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার সন্ধ্যায় গ্রহণ করতে হবে।

শিশু (৬ মাস-৬ বছর): ৪ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার সন্ধ্যায় গ্রহণ করতে হবে।

সিজন্সাল এলার্জিক রাইনাইটিস:

প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু (১৫ বছরের উর্ধ্বে): ১০ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার সন্ধ্যায় গ্রহণ করতে হবে।

শরীরচর্চা জনিত শ্বাসনালীর সংকোচন:

শরীরচর্চার অন্তত ২ ঘণ্টা পূর্বে ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

মন্টিলুকাস্ট সাধারণত সুসহনীয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে মাথাব্যথা, র‍্যাশ, বদহজম, ঘুমঘুম ভাব, ইডেমা, কাঁপুনি, আত্মঘাতী চিন্তা এবং পেটব্যথা খুব সাধারণ।

বিশেষ গ্রন্থের ব্যবহার :

গর্ভাবস্থায়: মন্টিলুকাস্ট প্লেগনেসি ক্যাটাগরি বি ওয়ুধ। এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এটি গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুগ্ধদান: মন্টিলুকাস্ট মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

শিশু: ২-১৪ বছর বয়সের শিশুদের উপর মন্টিলুকাস্ট পরীক্ষিত। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মন্টিলুকাস্ট শিশুদের বৃদ্ধির হারে কোন প্রভাব ফেলেনা।

প্রতিনির্দেশনা :

মন্টিলুকাস্ট বা এর কোনো উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে।

সতর্কতা :

তীব্র অ্যাজমা চিকিৎসায় মন্টিলুকাস্ট নির্দেশিত নয়। মন্টিলুকাস্ট গ্রহণকালে যে সমস্ত রোগীর এসপিরিনের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের এসপিরিন বা NSAID সেবন এড়িয়ে যেতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :

অ্যাজমার প্রতিষেধকমূলক অথবা দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার পাশাপাশি মন্টিলুকাস্ট খাওয়া যায়। থিওফাইলিন, প্রেডনিসন, প্রেডনিসোলন, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভস, টারফিনাডিন, ডিজক্লিন এবং ওয়ারফেরিন এর সাথে নির্দেশিত মাত্রায় মন্টিলুকাস্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া করে না। ফেনিটোইন, ফেনোবারবিটাল এবং রিফামপিসিন এর সাথে মন্টিলুকাস্ট গ্রহণ করার সময়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, সতর্ক থাকা উচিত।

সংরক্ষণ :

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে এবং ঠান্ডা স্থানে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ :

মন্টিল্যাব ৫ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে রয়েছে ৩ X ১০ ট্যাবলেট, অ্যালু-অ্যালু ক্রিস্টার প্যাকে।

মন্টিল্যাব ১০ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে রয়েছে ২ X ১০ ট্যাবলেট, অ্যালু-অ্যালু ক্রিস্টার প্যাকে।

Labaid
Pharma

প্রস্তুতকারকঃ ল্যাবএইড
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
সাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ