

Rupa-Aid

Rupatadine

Composition :

Rupa-Aid 10 Tablet : Each tablet contains Rupatadine Fumarate INN equivalent to 10 mg of Rupatadine.

Description :

Rupatadine is a long-acting, non-sedative antagonist of histamine H₁-receptors. It also antagonizes the platelet-activating factor (PAF). Both histamine and PAF cause bronchoconstriction which leads to an increase in the vascular permeability and act as a mediator in the inflammatory process. With the dual mode of action, Rupatadine shows better therapeutic effect than an isolated antihistamine. Rupatadine possesses other anti-allergic properties such as the inhibition of the degranulation of mast cells induced by immunological and non-immunological stimuli and inhibition of the release of cytokines, particularly of the tumor necrosis factor alpha (TNF α) in human mastocytes and monocytes.

Indication :

Rupatadine is indicated for the symptomatic treatment of Seasonal & Perennial Allergic Rhinitis and Urticaria.

Dosage and Administration :

Adults and adolescents (above 12 years) - The recommended dosage is 10 mg once daily, with or without food.

Side Effect :

Sleepiness, headache, dizziness, dry mouth, fatigue, asthenia.

Use in Pregnancy & Lactation :

No adequate data available. Caution should be exercised when prescribing Rupatadine to pregnant or lactating women; it is unknown whether Rupatadine is excreted into breast milk.

Contraindications :

Hypersensitivity to Rupatadine or to any of the excipients.

Precautions :

Rupatadine should be used with caution in patients with known prolongation of the QT interval, patients with uncorrected hypokalemia, patients with ongoing proarrhythmic conditions, such as clinically significant bradycardia or acute myocardial ischemia. Rupatadine should be used with caution in elderly patients (65 years and older) due to little clinical data. As there is no clinical experience in patients with impaired kidney or liver function, the use of Rupatadine tablets is at present not recommended in these patients.

Drug Interaction :

The concomitant administration of Rupatadine and Ketoconazole or Erythromycin increases the systemic exposure. Rupatadine should be used with caution when it is coadministered with statins or CNS depressants or alcohol.

Storage :

Keep away from light, moisture and store below 30° C. Keep out of reach of children.

Commercial Pack :

Rupa-Aid 10 Tablet : Each box contains 3 X 10 tablets, in Alu-PVDC blister pack.

রুপা-এইড

রুপাটাডিন

উপাদানঃ

রুপা-এইড ১০ ট্যাবলেট : প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে রুপাটাডিন ফিউমারেট আইএনএন যা ১০ মি.গ্রা. রুপাটাডিন এর সমতুল্য।

বর্ণনাঃ

রুপাটাডিন একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী ননসিডেটিভ হিস্টামিন H₁ রিসেপ্টর এন্টাগনিস্ট। এটি প্লাটিলেট এ্যাকটিভেটিং ফ্যাক্টরকেও (PAF) বাধা প্রদান করে। হিস্টামিন এবং PAF উভয়ই ব্রংকোকনস্ট্রিকশন করে যা ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ায় ও প্রদাহ সৃষ্টি করে। দ্বৈত কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে রুপাটাডিন অন্য এন্টিহিস্টামিন এর চেয়ে ভালো কার্যকারিতা দেখায়। এছাড়া রুপাটাডিনের অন্য এন্টিএলার্জিক বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন - ইমিউনোলজিক্যাল এবং ননইমিউনোলজিক্যাল উদ্দীপনা দ্বারা সংঘটিত মাস্টসেলের ডিগ্র্যানুলেশন প্রতিরোধ, মাস্টসেল ও মনোসাইট হতে সাইটোকাইনের বিশেষত: TNF α এর নিঃসরণ প্রতিরোধ ইত্যাদি।

নির্দেশনাঃ

রুপাটাডিন সিজনাল পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস এবং আর্টিকারিয়া তে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ১২বছর এর ঊর্ধ্বে : দৈনিক ১টি ট্যাবলেট, খাওয়ার আগে বা পরে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

ঘুম ঘুম ভাব, মাথাব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা, শুষ্কমুখ, অবসাদ, দুর্বলতা।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালেঃ

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। রুপাটাডিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

প্রতিনির্দেশনাঃ

রুপাটাডিন বা এতে ব্যবহৃত অন্য যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

সতর্কতাঃ

যাদের QT ইন্টারভ্যাল বেড়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সেবনে সতর্কতা নিতে হবে। যে সকল রোগীর অসংশোধিত হাইপোক্যালিমিয়া, নিরবিচ্ছিন্ন প্রোএরিদমিক অবস্থা যথা ক্লিনিক্যালি তাৎপর্যপূর্ণ ব্রাডিকার্ডিয়া অথবা একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে। বৃদ্ধ রোগীদের (৬৫ বছর বা তার ঊর্ধ্বে) ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে। যে সকল রোগীর কিডনি অথবা যকৃত কার্যক্রমে সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে রুপাটাডিন প্রয়োজ্য নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়াঃ

কিটোকোনাজল অথবা ইরাইথ্রোমাইসিনের সাথে রুপাটাডিন একত্র সেবনে সিস্টেমিক এন্সপোজার বৃদ্ধি পায়। এ সকল ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। স্ট্যাটিন বা সিএনএস ডিপ্রেসেন্ট বা এলকোহলের সাথে রুপাটাডিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

সংরক্ষণঃ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে এবং ৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

রুপা-এইড ১০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট, অ্যালু-পিভিডিসি ব্লিস্টার প্যাকে।

Labaid
pharma

Manufactured by:

LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Savar, Dhaka, Bangladesh

PS-IS-024/V01

Labaid
pharma

প্রস্তুতকারকঃ

ল্যাবএইড
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ